

23.09.2010

MAGNEZİ KALSİNE

BİLEŞİMİ:

Bir Şişede 100 gr. Saf Magnezyum Oksit Vardır.

ÖZELLİKLERİ:

'MAGNEZİ KALSİNE' mide asidini nötralize ederek, mide ekşiliğini giderir, aynı zamanda laksatif ve adsorban etkiye sahiptir.

KULLANILDIĞI YERLER:

Dispepsilerde adsorban ve laksatif olarak, peptik ülserde, gastrit, peptik esofagit gastrit hiperasidite hemeroidlerde, yaşlıların kabızlığında laksatif olarak.

KONTRENDİKASYONLAR:

Şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma gibi apandisit belirtilerinde ve şiddetli böbrek hastalıklarında kullanılmamalıdır.

BAŞKA İLAÇLARLA ETKİLEŞME:

Tetrasiklin grubu, antibiyotikler, antihistaminikler, demirli preparatlar, varfarin, kinidin, digoxin gibi ilaçların adsorbsiyonlarını azaltıp tedaviyi etkileyeceğinden bu gibi ilaçlar 'MAGNEZİ KALSİNE' alındıktan sonraki 1-2 Saat içinde ağızdan alınmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımına bağlı olarak diyare gelişirse, bu durum elektrolit dengesizliğine neden olabilir.

KULLANIŞI:

Mide ekşikliğinde 0.5-1 gr. hafif müshil olarak 2-3 gr. müshil olarak 8-10 gr. (gece yatarken alınır.) Arsenik ve asit zehirlenmelerinde 15-25 gr. (lyice dolu bir kahve kaşığı takriben 2 gr. olarak hesap edilmelidir.)

REÇETESİZ SATILIR:

İlaçları çocukların erişemeyeceği yerde ve ambalajında saklayınız.

Hekime danışmadan kullanmayınız.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Fiyat küpürü bulunmayan ambalajları satın almayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza müracaat ediniz.

TİCARİ ŞEKLİ:

100 gr.lık cam kavanozlarda

RUHSAT TARİHİ ve NO.:

10.07.1980 - 129/10

RUHSAT SAHİBİ:

İSTANBUL İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

Şerifali Mah. Kible Sok. No: 22 Kat.3 Ümraniye / İSTANBUL

www.ii.com.tr

İMAL YERİ:

MERKEZ LABORATUARI İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Sırrı Çelik Bulvarı, Ayça Sok. No: 6 Ümraniye / İSTANBUL