

## KULLANIM KILAVUZU

**Ürünün adı:**  
IL 33 Çözelti

**Birim formülü:**  
10 ml:

Trikloroasetik asit	: 9,0 g.
Monokloroasetik asit	: 0,8 g.
Dikloroasetik asit	: 0,2 g.
Deiyonize su	:10,0 ml

**Tıbbi özellikleri:**  
Sigiller (verrüs) sert, küçük deri çıkıntılardır. Selim olarak derinin mukozanın ve papilanın hipertrojisinden hasil olmuşlardır. Klinik görünüşleri çeşitlidir. Vücudun el, ayak, omuz, boyun ve gene nahyesinde yerleşirler. IL-33, bileşimindeki monokloroasetik asit, dikloroasetik asit ve trikloroasetik asit dezentektan - antiseptik özelliktedir. Lezyon üzerine sürüldüğünde proteinleri göktürerek hem sigili kitlesinde koterizan etkiyle küçülmeve neden olur, hem de etkeni olan insan papilloma virüsüne karşı antiviral etkinlik gösterir.

**Önerilen kullanım yeri:**  
IL 33, sigili tedavisinde kullanılır.

**Uyarılar/ÖNLEMLERİ:**  
İlaç kuvvetli yakıcı asit karakterinde olup sadece belirtilen şekilde haricen ve lokal olarak kullanılır. İlaçın tarif dışı kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Gözle ve mukoza ile temas ettirilmemelidir. Eğer göz veya mukozaya temas ederse bol miktarda su ile yıkanmalıdır.

**Gebelik ve laktasyonda kullanımı:**  
Gebelik kategorisi: C  
İnsanlarda fetoksisitesini araştıran kontrollü klinik çalışma yoktur. Ancak uygulama bölgesi ve uygulanan miktar göz önüne alındığında gebelikte kullanımda fetusa ulaşması ve etki göstermesi beklenmez. Gebelikte doktor tarafından tavsiye edildiği takdirde yarar zarar oranı dikkate alınarak kullanılabilir. Uygulama bölgesi ve uygulanan miktar göz önüne alındığında süte ulaşması beklenmez. Emziren annelerde doktor tarafından tavsiye edildiği takdirde kullanımasında sakınca yoktur.

**Araç ve makine kullanmaya etkisi:**  
Etkisi yoktur.  
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, mutlaka doktorunuza, eczacınıza bildiriniz.

## ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE BULUNDURUNUZ

### Yan etkiler / advers etkiler:

Sigillerin etrafındaki normal deri ile temas ettiğinde lokal irritan etki görülebilir. Sadece sigillerin bulunduğu bölgeye uygulamak ve kullanıma bir süre ara vermek sureti ile iritasyon kontrol altına alınabilir. Eğer daha büyük hasar olursa ilaç uygulamayı kesilmeli ve lezyona yönelik tedavi yapılmalıdır.

"İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz."

### İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler:

Başka ilaçlarla etkileşimi yoktur. İlaç asit karakterinde olduğundan hidroksitler, oksitler ve karbonatlar gibi bazı karakterli maddelerle temas ettirilmemelidir.

### Günlük kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kutu içindeki etiketten birisi alınır. İkiye ve döndre katlanır, makasla kesilerek sigili büyüldüğünde bir delik açılır. Sigili açığa kalmak şartıyla deri üzerine yapışır. Şişe kapağı dikkate açılır. Kapağındaki bagele ilaç sigili üzerinde sürdürür. Tedavi sabah akşam günde 2 defa tatbik edilerek yapılır. Genelikle 3-5 tatbik yeterli olur.

**Ticari takdim şekli:**  
10 ml'lik bal cam şişelerde, kullanım kılavuzu ile kutuda bir adet olarak piyasaya arz edilmiştir.

### İzin sahibi ve adresi:

İstanbul İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Şerifali Mah. Kible Sok. No:22 K.3 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: (0216) 415 15 80

### Üretici İslm ve adresi:

Merkez Laboratuvarı İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Sırrı Çelik Bulvarı Ayça Sok. No:6

Çekmeköy - Ümraniye / İSTANBUL

### Lisans sahibinin ismi:

Yerli Üretim.

25°C nin altındaki oda sıcaklığında (özel bir durum belirtilmemişse) kendi orijinal ambalajında ve kapağı kapalı olarak ve çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Kapağın altındaki muhafaza yırtık veya kırık veya kullanılmayınız.

**SADECE ECZANELERDE SATILIR.**