

## KULLANIM KILAVUZU

### ÜRÜNÜN ADI:

İL-33 Çözelti

### BİRİM FORMÜLÜ :

10 ml:

Trikloroasetik asit : 9.0 g

Monokloroasetik asit : 0.8 g

Dikloroasetik asit : 0.2 g

Deiyonize su : 10.0 ml

### TIBBİ ÖZELLİKLERİ :

Siğiller (verrüs) sert, küçük deri çıkıntılarıdır. Selim olarak derinin mukozanın ve papilanın hipertofisinden hasıl olmuşlardır. Klinik görünüşleri çeşitlidir. Vücudun el, ayak, omuz, boyun ve çene nahliyesinde yerleşirler. İL-33 bileşimindeki monokloroasetik asit, dikloroasetik asit ve trikloroasetik asit dezenfektan – antiseptik özelliktedir. Lezyon üzerine sürüldüğünde proteinleri çöktürerek hem siğil kitlesinde koterizan etkiyle küçülmeye neden olur, hem de etkeni olan insan papilloma virüsüne karşı antiviral etkenlik gösterir.

### ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

İL 33, siğil tedavisinde kullanılır.

### UYARILAR/ÖNLEMLER:

İlaç kuvvetli yakıcı asit karakterinde olup sadece belirtilen şekilde haricen ve lokal olarak kullanılır. İlacın tarif dışı kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Gözle ve mukoza ile temas ettirilmemelidir. Eğer göz veya mukozaya temas ederse bol miktarda su ile yıkanmalıdır.

### GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:

Gebelik Kategorisi : C

İnsanlarda fetoksisitesini araştıran kontrollü klinik çalışma yoktur. Ancak uygulama bölgesi ve uygulanan miktar göz önüne alındığında gebe kadınlarda fetusa ulaşması ve etki göstermesi beklenmez. Gebelikte doktor tarafından tavsiye edildiği takdirde yarar zarar oranı dikkate alınarak kullanılabilir. Uygulama bölgesi ve uygulanan miktarı göz önüne alındığında süte ulaşması beklenmez. Emziren annelerde doktor tarafından tavsiye edildiği takdirde kullanılmasında sakınca yoktur.

### ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ:

Etkisi yoktur.

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, mutlaka doktorunuza, eczacınıza bildiriniz.

### ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE BULUNDURUNUZ.

### YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:

Siğillerin etrafındaki normal deri ile temas ettiğinde lokal iritan etki görülebilir. Sadece siğillerin bulunduğu bölgeye uygulamak ve kullanıma bir süre ara vermek sureti ile irritasyon kontrol altında alınabilir. Eğer daha büyük hasar oluşursa ilaç uygulaması kesilmeli ve lezyona yönelik tedavi yapılmalıdır.

“İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijians Merkezi (TÜFAM)’ne Bildiriniz.”

**İLAÇ ETKİLEŞMENLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:**

Başka ilaçlarla etkileşimi yoktur. İlaç asit karakterinde olduğundan hidroksitler, oksitler ve karbonatlar gibi bazik karakterli maddelerle temas ettirilmemelidir.

**GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:**

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kutu içindeki etiketten birisi alınır. İkiye ve dörde katlanır makasla kesilerek siğil büyüklüğünde bir delik açılır. Siğil açıkta kalmak şartıyla deri üzerine yapıştırılır. Şişe Kapağı dikkatle açılır. Kapağındaki bagetle ilaç siğil üzerine sürülür. Tedavi sabah akşam günde 2 defa tatbik edilerek yapılır. Genellikle 3-5 tatbik yeterli olur.

**TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:**

10 ml’lik bal cam şişelerde, kullanım kılavuzu ile kutuda bir adet olarak piyasaya arz edilmiştir.

**İZİN NUMARASI:** 06.03.2006-2006/13

**İZİN SAHİBİ:**

İstanbul İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Kartal / İstanbul

**ÜRETİM YERİ:**

Şifa Kimya İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret. A.Ş.  
Selçuklu / Konya

**LİSANS SAHİBİ İSMİ :**

Yerli Üretim.

25<sup>0</sup>C’nin altındaki oda sıcaklığında (özel bir durum belirtilmemişse) kendi orijinal ambalajında ve kapağı kapalı olarak ve çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Kapağın altındaki muhafaza yırtık veya kırık ise kullanmayınız.

**SADECE ECZANELERDE SATILIR.**